

## Het verloop van de Carboplatin/Cyclofosfamide/Atezolizumab kuur, triple B studie arm 1c

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit drie medicijnen.

1. Carboplatin
2. Cyclofosfamide
3. Atezolizumab

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
C														A														
C																												
A																												

### Wijze van toediening:

De medicijnen worden u toegediend via een infuus in een ader in uw hand of arm. Deze behandeling vindt plaats op dagbehandeling oncologie van ZGT. De toediening duurt ongeveer twee en een half uur. De kuur wordt afhankelijk van de bloedsuitslagen om de vier weken gegeven.

### Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38,5° moet u contact met ons opnemen.
- Uw haar gaat uitvallen. Dit is van tijdelijke aard en begint meestal twee á drie weken na de eerste toediening. Haaruitval begint meestal met een pijnlijke hoofdhuid. Een machtiging voor een eventuele pruik kunt u vragen aan de oncologieverpleegkundige.
- Cyclofosfamide kan klachten geven die lijken op een blaasontsteking. Het is daarom van belang dat u gedurende de eerste dagen na de toediening veel drinkt (anderhalf tot twee liter)
- Resten cytostatica kunnen tot dag vijf in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen over hoe u hiermee om kunt gaan.
- Atezolizumab kan gepaard gaan met late reacties. Zie de PIF van de triple B studie.

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen.

#### Almelo

Zilvermeeuw 1  
Postbus 7600  
7600 SZ Almelo

#### Hengelo

Geerdinksweg 141  
Postbus 546  
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT\_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt