

Hoe gaat de behandeling van carboplatin/pemetrexed/ipilimumab/nivolumab kuur

U begint met een combinatietherapie die bestaat uit chemotherapie en immunotherapie. Deze kuur bestaat uit vier medicijnen.

1. **C**arboplatin (chemotherapie)
2. **P**emetrexed (chemotherapie)
3. **I**pilimumab (immunotherapie)
4. **N**ivolumab (immunotherapie)

Verloop

Deze kuur krijgt u om de drie weken.

De eerste twee kuren zijn immunotherapie in combinatie met chemotherapie.

Vanaf de derde kuur krijgt u alleen nog immunotherapie. Hierbij krijgt u om de week twee middelen.

| | |
|---------------------|---|
| 1 ^e kuur | Carboplatin / pemetrexed Ipilimumab / Nivolumab |
| 2 ^e kuur | Carboplatin / Pemetrexed Nivolumab |
| 3 ^e kuur | Ipilimumab / Nivolumab <i>(vanaf de derde kuur elke oneven kuur 2 middelen immunotherapie)</i> |
| 4 ^e kuur | Nivolumab <i>(vanaf de vierde kuur elke even kuur 1 middel immunotherapie)</i> |

Hoe krijgt u de medicatie:

U krijgt de medicijnen via een infuus in een ader in uw hand of arm. Deze behandeling gebeurt op de dagbehandeling oncologie van ZGT locatie Hengelo.

De toediening duurt ongeveer twee en een half uur. De kuur wordt afhankelijk van de bloedsuitslagen om de drie weken gegeven.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 zgt.nl/mijnzgt

 zorgkaart <http://bit.ly/1y7WjbP>

 facebook.com/zgtinfo

 linkedin.com/company/zgt

 twitter.com/zgt_info

 youtube.com/user/zgtinfo

Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38,5° moet u contact met ons opnemen.
- Uw haar valt meestal niet uit, het kan wel dunner worden. Wanneer u een pruik wilt, kunt u hier een machtiging voor vragen aan de oncologieverpleegkundige.
- Eén week voor u start met de chemotherapie krijgt u een vitamine B12 injectie. Met deze injectie werkt de pemetrexed beter en heeft u er minder last van.
- Eén week voor u start met de chemotherapie gaat u starten met foliumzuur, elke ochtend één tablet. Hier gaat u mee door tot en met drie weken na de laatste chemokuur. Dit wordt gegeven om de werking en de verdraagzaamheid van pemetrexed te verbeteren.
- Resten chemotherapie kunnen tot dag vijf in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen over hoe u hiermee om kunt gaan.

De bijwerkingen van ipilimumab en nivolumab staan in de bijgeleverde folder en waarschuwingskaart.

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.