

Blindedarm operatie kind

Uw kind is net geopereerd vanwege een ontstoken blindedarm. In deze folder leest u welke nazorg er na deze ingreep is.

Na de ingreep

Na de operatie heeft uw kind een infuus. Vooral de eerste dag heeft uw kind pijn in de buik. Uw kind krijgt standaard, tijdens de eerste 48 uur, medicijnen tegen de pijn. Meestal in de vorm van zetpillen. Daarna wordt alleen pijnbestrijding gegeven als het nodig is.

Meteen na de operatie krijgt uw kind drinken (water, ranja of appelsap). Als dit goed gaat, krijgt uw kind ook licht verteerbaar voedsel. De dag na de operatie kan uw kind meestal weer gewoon eten.

Na enkele dagen beginnen de darmen 'weer op gang te komen'. Dit kan zorgen voor wat buikpijn.

De verpleegkundige controleert de wond regelmatig. Zo gauw uw kind zich daartoe in staat voelt, mag het even uit bed. Zorg in elk geval voor gemakkelijk zittende kleding. Of uw kind de dag na de operatie naar huis mag, ligt aan hoe de operatie is gegaan. Na twee dagen mag uw kind weer onder de douche. Als de wond droog is hoeft er geen nieuwe pleister meer op.

Wanneer uw kind een doorgebroken (geperforceerde) blindedarmontsteking had, moet uw kind na de operatie langer blijven. Uw kind krijgt dan een aantal dagen antibiotica per infuus. Hoeveel dagen dit zijn ligt aan de ernst van de ontsteking. Het eten en drinken wordt dan langzaam opgebouwd.

Nazorg thuis

De eerste week moet uw kind het rustig aan doen. Het mag niet rennen, fietsen en/of zwemmen. Ook is het verstandig om uw kind de eerste week nog niet naar school te laten gaan.

Bij kinderen worden vaak oplosbare hechtingen gebruikt. Deze hoeven niet verwijderd te worden. Soms zitten er hechtpleisters op de wond. Deze hechtpleisters vallen er vaak vanzelf af. Als de hechtpleisters er niet vanzelf afvallen, dan mag u deze er na 7 dagen zelf af halen. Eventuele niet-oplosbare hechtingen worden tijdens het bezoek aan de polikliniek verwijderd.

Complicaties (problemen)

Soms komt het voor dat er thuis toch nog complicaties optreden, bijvoorbeeld koorts boven de 38,5°C of buikpijn. Dit ondanks de pijnstilling of na enige tijd. In dit geval kunt u binnen kantooruren contact opnemen met de polikliniek heelkunde (chirurgie) en buiten kantooruren met de spoedeisende hulp.

Polikliniek heelkunde (Almelo)

Telefoonnummer 088 708 52 31
Routenummer 1.08

Polikliniek kindergeneeskunde (Almelo)

Telefoonnummer 088 708 31 20
Routenummer 0.11

Controleafspraak

Wanneer uw kind naar huis mag, krijgt u te horen wanneer er een controleafspraak is met de behandelend specialist.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de polikliniek heelkunde.

Check het dossier van uw kind op MijnZGT

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTInfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTInfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van het medisch dossier van uw kind inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie de folder [MijnZGT machtiging voor ouders](#).