

Huidpriktest

Om vast te stellen of uw klachten voortkomen uit een inhalatieallergie krijgt u een allergietest via een huidpriktest, in deze folder krijgt u hierover uitleg.

Wat is een allergietest?

Bij deze test wordt gekeken of uw lichaam een allergische reactie geeft op een aantal veel voorkomende allergenen. Allergenen zijn stoffen waarop je overgevoelig kunt reageren.

Vorbereidingen thuis

- In overleg met uw behandelend specialist moet u de medicijnen tegen allergie 72 uur voor de test gestopt worden (zie pagina 2).
- Eventueel andere medicatie die gestopt moet worden (zie pagina 2).
- Gebruik geen bodylotion en dergelijke op onderarmen of rug.

Waar meldt u zich?

Op de dag van de allergietest meldt u zich op de polikliniek KNO.

Route Almelo Route 1.7
Route Hengelo Route 0.5

Huidpriktest

Deze test wordt gedaan door de doktersassistent en vindt plaats met behulp van een vloeistof waarin het te testen medicijn is opgelost. De vloeistof wordt op de binnenkant van uw onderarm gedruppeld, in totaal 7 druppels. Met een klein naaldje (speldenprik) wordt de huid aangeprikt, zodat de vloeistof net onder de huid contact kan maken. Hierna gaat u naar de wachtruimte terug. Na ongeveer 15 minuten kan de uitslag van de test worden bekeken. Wanneer u reageert ontstaat er een iets jeukende, rode uitslag. Deze trekt weer snel weg. Het totale onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Uitslag

Uw behandelend medisch specialist deelt u de uitslag van het onderzoek mee. Hiervoor wordt een afspraak ingepland (indien mogelijk aansluitend aan de test).

Wat u verder nog moet weten

Een ernstige allergische reactie komt zeer zelden voor. U kunt dit herkennen aan uitgebreide roodheid en zwelling, ernstige benauwdheid en koorts (meer dan 38°C). Neem dan als volgt contact op met het ziekenhuis:

- Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met het secretariaat van de KNO-artsen, telefoonnummer 088 708 33 50.
- Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de afdeling spoedeisende hulp, telefoonnummer 088 708 78 78 (Zij overleggen, indien nodig, met uw behandelend specialist).

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

Medicijnen tegen allergie en jeuk
72 uur van te voren staken

Acrivastine	Lomudal
Aerius	Loratadine
Alimemazine	Mebhydroline
Allerfre	Mizolastine
Allergodil (Azelastine)	Mizollen
Atarax	Montelukast
Cetirizine	Nalcrom
Ciclosporine	Nedeltran
Claritine	Neoral
Clemastine	Oxatomide
Cromoglicinezuur	Periactin
Cyproheptadine	Polaramine
Desloratadine	Prevalin
Dexchlorfeniramine	Promethazine
Dimetindeen	Reactine
Dymista	Semprex
Ebastine	Singulair
Fenistil	Tavegil
Fexofenadine	Telfast
Hydroxyzine	Terfenadine
Kestine	Tinset
Ketotifen	Xyzal
Levocetirizine	Zaditen
Livocab (Levocabastine)	Zyrtec

Medicijnen tegen misselijkheid/duizeligheid
72 uur van te voren staken

Betahistine	Emesafene
Betaserc	Meclozine
Chloorcyclizine/ cinnarizine	Meclozine/pyridoxine
Cinnarizine	Primatour
Cyclizine	Suprimal

Antidepressiva
72 uur van te voren staken, altijd na overleg met uw behandelend specialist

Amitriptyline	Prothiaden
Anafranil	Quetiapine
Clomipramine	Remeron
Dosulepine	Sarotex
Doxepine	Seroquel
Maprotiline	Sinequan
Mianserine	Tolvon
Mirtazapine	Trazodon
Nortrilen	Trazolan
Nortriptyline	Tryptizol

Bètablokkers
48 uur van te voren staken, altijd na overleg met uw behandelend specialist

Acebutalol	Metoprolol
Atenolol	Nebilet
Bisoprolol	Nebivolol
Carvedilol	Oxprenolol
Celiprolol	Pindolol
Dilanorm	Propranolol
Emcor	Sectral
Eucardic	Selokeen
Kerlon	Sotalol
Labetalol	Viskeen

Maag/darm medicijnen
72 uur van te voren staken

Axid	Pepcidin
Cimetidine	Ranitidine
famotidine	Tagamet
Nizatidine	Zantac
Pepcid	