

Het verloop van de BEACOPP escalated kuur

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit zeven medicijnen:

1. **B**leomycine
2. **E**toposide
3. **A**driamycine (=doxorubicine)
4. **C**yclofosfamide
5. **O**ncovin (=vincristine)
6. **P**rocarbazine (tabletten, worden thuis ingenomen)
7. **P**rednison (tabletten, worden thuis ingenomen)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
C							O													
A							B													
E	E	E																		
P	P	P	P	P	P	P	P													
Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr							

Wijze van toediening:

Cyclofosfamide, adriamycine, etoposide, oncovin en bleomycine worden u toegediend via een infuus in een ader in uw hand of arm. Deze behandeling vindt plaats op de dagbehandeling oncologie van ZGT.

Op dag één wordt u de cyclofosfamide, adriamycine en de etoposide toegediend, op dag twee en drie krijgt u alleen etoposide. En op dag acht krijgt u oncovin en bleomycine. Procarbazine en prednison zijn tabletten en kunt u thuis innemen. Hier begint u mee op dag één. De procarbazine slikt u elke kuur zeven dagen en de prednison elke kuur veertien dagen. De kuur wordt afhankelijk van de bloeduitslagen om de drie weken gegeven.

Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38,5° moet u contact met ons opnemen. Door bleomycine kunt u op de dag van toediening koorts krijgen, meldt dit altijd.
- Uw haar gaat uitvallen. Dit is van tijdelijke aard en begint meestal twee à drie weken na de eerste toediening. Haaruitval begint meestal met een pijnlijke hoofdhuid. Een machtiging voor een eventueel haarwerk kunt u vragen aan de oncologieverpleegkundige.
- Door oncovin is obstipatie (verstopping van ontlasting) na de kuur mogelijk.
- Door adriamycine is tot enkele dagen na de kuur rood verkleuring van de urine en soms het traanvocht mogelijk. Dit is onschuldig. Het kan mogelijk aanleiding geven tot verkleuring van contactlenzen. Het is daarom aan te raden deze de eerste 48 uur na toediening niet te dragen.
- Cyclofosfamide kan klachten geven die lijken op een blaasontsteking. Het is daarom van belang dat u gedurende de eerste dagen na toediening veel drinkt (anderhalf tot twee

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 zgt.nl/mijnzgt

 zorgkaart <http://bit.ly/1y7WjbP>

 [facebook.com/zgtinfo](https://www.facebook.com/zgtinfo)

 [linkedin.com/company/zgt](https://www.linkedin.com/company/zgt)

 twitter.com/zgt_info

 [youtube.com/user/zgtinfo](https://www.youtube.com/user/zgtinfo)

liter).

- Prednison kan de opname van suiker in uw lichaam verstoren. Door prednison kan uw uiterlijk tijdelijk veranderen; bijvoorbeeld een blozend gezicht. Door prednison kunt u een opgejaagd gevoel krijgen en uw stemming kan wisselen.
- U kunt last krijgen van tintelingen en/of een doof gevoel in tenen, voetzolen en in de vingertoppen. Dit graag melden bij een volgend bezoek aan uw behandelend arts.
- Op procarbazine kunt u allergisch reageren, meldt dit direct.
- Tijdens procarbazine gebruik dient geen alcohol genuttigd te worden.
- Gedurende de kuurperiode krijgt u verschillende ondersteunende medicatie om bijwerkingen en complicaties te voorkomen:

Medicatie	Dosis	Toediening	Startdag	Stopdatum
Ondansetron (anti emetica)	8mg 1d1	Oraal	Dag 1 + 8 van iedere kuur	
Cotrimoxazol	480mg 1d1	Oraal	Vanaf dag 1, continue	Tot 4 weken na de laatste kuur
Omeprazol	20mg 1d1	Oraal	Vanaf dag 1, continue	Tot 4 weken na de laatste kuur
Ciproxin	500mg 2d1	Oraal	Dag 6 t/m 12 van iedere kuur	
Pegfilgrastim (=neulasta)	6mg wegwerpspuit	Subcutaan (verpleegkundige komt bij u thuis)	Dag 4 van iedere kuur	

- Resten cytostatica kunnen tot de elfde dag in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen over hoe u hiermee om moet gaan.

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.