

Longfunctie

Met behulp van dit onderzoek kan de functie van de longen worden onderzocht. Er wordt onder andere gekeken naar de inhoud van de longen en de hoeveelheid lucht die er maximaal uitgeblazen kan worden. Dit onderzoek zal ongeveer een half uur gaan duren.

Verloop van het onderzoek

Tijdens het onderzoek zit u op een stoel. U krijgt een mondstuk in de mond waarmee u verbonden bent met een meetapparaat dat de ademhaling zal registreren. Tevens krijgt u een klemmetje op de neus waardoor voorkomen wordt dat de lucht via de neus in- of uitgedemd kan worden.

Het is de bedoeling dat u een aantal oefeningen gaat blazen.

Als eerste wordt gekeken naar uw normale ademhaling, en vervolgens naar de hoeveelheid lucht die u bij maximale kracht ineens kunt uitblazen.

Nadat u deze oefeningen heeft geblazen krijgt u van de longfunctielaborant(e) een medicijn voor de longen dat moet worden ingeademd. Na \pm 10 minuten blaast u de oefeningen nog eens om te kijken of de medicijnen een eventuele verbetering van het resultaat laten zien.

Vorbereidingen thuis

Het is belangrijk dat u zo ontspannen mogelijk aan de test begint, dus kom op tijd. U wordt verwacht op polikliniek allergologie, route 2.11. Wanneer u longmedicatie gebruikt kunt u zien op de medicijnen lijst die op de achterkant op bladzijde 2 van deze folder staan, zien of u van tevoren moet stoppen met deze medicatie en hoelang van tevoren.

Uitslag

De allergoloog die u behandelt vertelt u de uitslag van het onderzoek.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, stel ze dan gerust. Tussen 8.30 uur en 12.00 uur en tussen 13.00 uur en 16.30 uur kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek allergologie, telefoonnummer 088 708 52 30.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

Lijst van medicijnen welke gestopt moeten worden voordat de test gedaan kan worden.

**Longmedicatie
72 uur van te voren stoppen**

Montelukast
Singulair

**Longmedicatie
48 uur van te voren stoppen**

Theofylline
Theolair retard

**Longmedicatie
8 uur van te voren stoppen**

Aerolin	Fenoterol
Airomir	Ipramol
Atrovent	Ipratropium
Berodual	Salamol
Berotec	Salbutamol
Bricanyl	Terbutaline
Bronchodual	Ventolin
Combivent	

**Longmedicatie
24 uur van te voren stoppen**

Airflubo	Oxis
Airflusal	Revlar
Anoro	Salflutin
Aectura	Salufer
Atimos	Salmeterol
Bevespi	Seretide
Bricanyl retard	Serevent
Bufoler	Spiolto
Busalair	Spiriva
Cromoglicinezuur	Symbicort
Duoresp	Tilade
Duaktir-genuair	Tiotropium
Enerzair	Tavulus
Flutiform	Tiotrus
Foradil	Trixeo
Formoterol	Trimbow
Foster	Tregely
Indaceterol=Hirobriz, Onbrez	Umeclidinum=Incruse
Lomudal	Ultibro
Nedocromil	Xoterna
Olodateol=Striverdy	

**Medicatie tegen hoesten
72 uur van te voren stoppen**

Oxomemazine
Toplexil