

Behandeling met ijzerinfuus Ferinject tijdens zwangerschap of kraambed

Uw gynaecoloog heeft met u besproken dat het ijzergehalte van uw bloed te laag is. Als een behandeling met een ander middel onvoldoende resultaat heeft, kunt u behandeld worden met het medicijn Ferinject. In deze folder informeren wij u wat het belang van ijzer is voor uw lichaam, de bijwerkingen en de manier van toedienen.

Het belang van ijzer voor uw lichaam

Rode bloedcellen hebben hun rode kleur te danken aan het eiwit hemoglobine. De belangrijkste functies van hemoglobine zijn:

- Transport van zuurstof van de longen en naar het weefsel in het lichaam.
- Transport van koolstofdioxide van het weefsel terug naar de longen.

Net zoals zuurstof is ijzer een noodzakelijke stof in het lichaam. Deze stof zorgt ervoor dat zuurstof zich kan binden aan hemoglobine. Ijzer is betrokken bij veel andere functies die noodzakelijk zijn voor het in stand houden van uw lichaamsfuncties. Kortom: ijzer is belangrijk voor een goede conditie, zorgt ervoor dat u zich beter kunt concentreren en het houdt uw huid, haar en nagels gezond. Ook versterkt het de afweer tegen ziektes. Tijdens de zwangerschap is het Hb-gehalte altijd wat lager dan buiten de zwangerschap. Dat komt omdat u in de zwangerschap meer bloed in uw lichaam heeft, met verhoudingsgewijs meer vocht (plasma) dan rode bloedcellen. Ook na de bevalling kan het Hb-gehalte laag zijn doordat u bijvoorbeeld veel bloed bent verloren tijdens de bevalling.

Zo komt ijzer in uw lichaam

Uw lichaam maakt zelf geen ijzer aan. Daarom moet u dagelijks genoeg ijzer via uw voeding binnen krijgen. Ongeveer tien procent van het ijzer dat u via uw voeding binnenkrijgt, komt via de darm in het bloed terecht. Daar bindt het zich aan transferrine. Dit is een stof in uw lichaam die ervoor zorgt dat het ijzer op die plaatsen in het lichaam komt waar het nodig is. Het ijzer dat het

lichaam niet direct nodig heeft, wordt in de lever en de milt opgeslagen.

Een ijzertekort

Als u via uw voeding niet meer voldoende ijzer binnenkrijgt of opneemt, dan gaat uw lichaam het ijzer dat in de lever en milt is opgeslagen gebruiken. Als die voorraad op is, ontstaat er ijzertekort.

Dit kan de volgende klachten geven:

- Gevoel van flauwvallen
- Kortademigheid
- Hartkloppingen
- Weinig eetlust
- Vermoeidheid
- Transpireren
- Duizeligheid
- Oorsuizen
- Bleekheid
- Hoofdpijn
- Een versnelde hartslag (bij ernstige bloedarmoede)

Behandeling met Ferinject

Ferinject is een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor het behandelen van bloedarmoede. Het doel van de behandeling is het aanvullen van de ijzervoorraden in het lichaam en het behandelen van het ijzertekort.

Uw gynaecoloog heeft u vanwege een ijzertekort een infuus met het medicijn Ferinject voorgeschreven. Voor deze behandeling wordt u een aantal uren opgenomen op de afdeling geboorte. Indien u al opgenomen bent, bijvoorbeeld na de

Almelo

Zilvermew 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

bevalling, dan krijgt u het infuus tijdens de opname.

U krijgt, als u dit nog niet heeft, een infuus. Het medicijn heeft een donkerbruine kleur. De toedieningstijd van het medicijn is vijftien tot 30 minuten. Dit betekent dat u een half uur aan het infuus bent aangesloten, waarna u nog minimaal 30 minuten ter observatie blijft, een enkele keer treedt een allergische reactie op. In totaal duurt de behandeling één à twee uur.

U kunt iemand meenemen om tijdens de behandeling bij u te zijn. U wordt tijdens de hele behandeling door een verpleegkundige in de gaten gehouden. Mocht u zich tijdens de behandeling niet lekker gaan voelen dan moet u dit direct bij de verpleegkundige melden. Voor de behandeling met Ferinject zijn geen voorbereidingen nodig.

Na de behandeling

Na de behandeling kunt u zelf naar huis, ook mag u zelf autorijden.

Na de behandeling met Ferinject mag u de ijzertabletten die de arts u eerder heeft voorgeschreven, niet meer gebruiken.

Ferinject vervangt deze, zo wordt voorkomen dat u te veel ijzer binnen krijgt.

Vier weken na de behandeling laat u bij het laboratorium bloedprikken om het Hb-gehalte te checken.

Voor zwangerschapscontroles op de polikliniek heeft of krijgt u een vervolgspraak. Als u bevallen bent krijgt u vijf weken na de behandeling een (telefonische) afspraak.

Bijwerkingen

Het medicijn Ferinject kan tijdens het toedienen of als u weer thuis bent bijwerkingen veroorzaken.

De volgende klachten kunnen zich voordoen:

- Hoofdpijn
- Duizeligheid
- Misselijkheid
- Buikpijn, verstopping, diarree

- Reacties op de plaats waar het infuus in uw arm heeft gezeten (branderig, pijnlijk gevoel, roodheid, zwelling en een blauwe plek).

De klachten gaan doorgaans vanzelf over. Als u het niet vertrouwt of als u zich zorgen maakt, meld dit dan bij de verpleegkundige van de afdeling.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, uw gynaecoloog, verloskundige, verpleegkundige of huisarts is altijd bereid ze te beantwoorden.

Algemene informatie

Telefoonnummers

- Voor zwangeren is onze polikliniek/afdeling verloskunde op locatie Almelo bereikbaar op telefoonnummer: **088 708 44 16**

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.