

Trastuzumab emtansine, patiënteninformatie

U begint met een chemokuur. De kuur bestaat uit één medicijn.

1. Trastuzumab-Emtansine

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
TE																					

Wijze van toediening:

Het medicijn worden u toegediend via een infuus in een ader in uw hand of arm. De behandeling vindt plaats op de dagbehandeling oncologie van de ZGT Hengelo. De eerste toediening duurt ongeveer twee en een half uur. Vanaf de tweede kuur duurt de toediening één uur. De kuur wordt afhankelijk van de bloedsuitslagen om de drie weken gegeven.

Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- U kunt koorts krijgen. Bij koorts boven de 38,5 moet u contact met ons opnemen.
- U kunt last krijgen van tintelingen en/of een doof gevoel in de vingertoppen en/of tenen. Meldt dit altijd bij het volgende bezoek aan het ziekenhuis.
- Hoofdpijn, spierpijn en gewrichtspijn is een veel voorkomende bijwerking. Meestal merkt u dit twee tot drie dagen na de toediening. U mag zo nodig maximaal 4 keer per dag 1000 mg paracetamol innemen.
- Resten cytostatica kunnen tot dag acht in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, speeksel en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen over hoe u hiermee om kunt gaan.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 zgt.nl/mijnzgt
 zorgkaart <http://bit.ly/1y7WjbP>
 facebook.com/zgtinfo

 linkedin.com/company/zgt
 twitter.com/zgt_info
 youtube.com/user/zgtinfo